

# Duflegrip Free

Paracetamol  
Fenilefrina

Descongestivo  
Antifebril  
Analgésico

Venta Libre - Industria Argentina  
Contenido: 20 comprimidos recubiertos

FECOFAR

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.

## Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol (Como Paracetamol CD <sub>30</sub> )	500,00 mg
Fenilefrina Clorhidrato	6,00 mg

Excipientes: Correspondientes al Paracetamol CD<sub>30</sub> (Povidona, Almidón, Almidón Glicolato de Sodio, Almidón Pregelatinizado, Acido Esteárico, Propil hidroxibenzoato de Sodio, Etil hidroxibenzoato de Sodio); Cellactose 80, Croscaramelosa sódica, Estearato de magnesio, Opadry II blanco, Sacarina sódica, Laca aluminica amarillo de quinolina.

## Acciones:

Descongestivo, antifebril y analgésico.

## ¿Para qué se usa?

Duflegrip Free está indicado para el alivio de congestión nasal, fiebre y dolor de cabeza asociado al cuadro gripal.

## Cómo usar este medicamento:

Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.

Dosis máxima de Paracetamol: 4 g/día (8 comprimidos conteniendo 500 mg de Paracetamol).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

No exceder las dosis aconsejadas. Si los síntomas (fiebre, dolor o congestión nasal) persisten o empeoran consulte a su médico.

Especialidad medicinal de administración oral. Ingerir el comprimido con suficiente agua o jugo, sin ser masticado. Su administración puede realizarse con las comidas o alejado de las mismas.

## ¿Qué personas no pueden recibir Duflegrip Free?:

No utilice este producto si tiene alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

Paracetamol: No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

Si sufre hipertiroidismo, glaucoma, si está o ha estado en los 20 días anteriores a la toma de este medicamento en tratamiento con medicamentos usados en el tratamiento de la depresión y/o

enfermedad de parkinson (IMAOs). Si padece insuficiencia renal o hepática, si padece enfermedad cardíaca o hipertensión arterial severa, si esta embarazada o en periodo de lactancia.

## ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

No utilice DUFLEGRIP FREE si padece de insuficiencia renal ó hepática, si padece enfermedad cardiaca o hipertensión arterial severa, si está embarazada o en periodo de lactancia. Tampoco utilice este producto si tiene alergia a algunos de sus componentes.

No exceder la dosis recomendada, dado que a posologías superiores puede producir nerviosismo, insomnios o mareos. Personas con diabetes, hipertiroidismo, enfermedades prostáticas o estando bajo la ingesta de antidepresivos deberán consultar a su médico.

Si los síntomas perduran por más de 5 días, o la fiebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico.

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

El Paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto.

Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted toma al mismo tiempo: anticoagulantes, antiinflamatorios, anticonvulsivos o medicación para la epilepsia, anticonceptivos orales, antibióticos, diuréticos, antiespasmódicos, anti-nauseosos, medicación para el corazón, otros descongestivos por vía oral, oftálmicos o colocados en las fosas nasales, medicamentos para la depresión o para dolores neuropáticos. Consulte a su médico antes de ingerir este producto.

## ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Puede aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como: erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

## ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Vaya al Hospital más cercano ó comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

## Presentaciones:

Envases por 10, 20 y 30 Comprimidos Recubiertos.

Envases hospitalarios por 100, 500 y 1000 Comprimidos Recubiertos.

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.  
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, AL ABRIGO DE LA LUZ.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 56.445

Director Técnico: Carlos Fiorito, Farmacéutico.  
Fecha de última revisión: 09/11  
Elaborado en Virgilio 844 - C1407BQP - C.A.B.A.

## Laboratorios Fecofar

Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.