

pectoral hebert

Bromhexina Clofediano

Jarabe pediátrico



Venta bajo receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada 100 ml de jarabe contiene:

Clorhidrato de Bromhexina	20 mg
Clorhidrato de Clofediano	140 mg
Azúcar	30 g
Sacarina sódica	100 mg
Acido cítrico anhidro	250 mg
Hidróxido de sodio	80 mg
Benzoato de sodio	150 mg
Esencia de bananas	30 mg
Tartrazina	0,6 mg
Alcohol etílico	5,0 ml
Agua desionizada c.s.p.	100 ml

Acción terapéutica:

Antitusígeno. Expectorante.

Indicaciones:

Alivio sintomático de la tos no productiva.

Acción farmacológica:

Bromhexina: mucoregulador por activación de la síntesis de sialomucinas.

Clofediano: reduce la frecuencia de la tos por acción central.

Farmacocinética:

Bromhexina: se absorbe rápidamente del tubo digestivo. Su unión a proteínas es alta y se excreta como metabolitos en la orina.

Clofediano: se absorbe lentamente del tubo digestivo y la duración de la acción es de 6 a 8 horas.

Posología y forma de administración:

Niños de 2 a 6 años: 7,5 ml 3 a 4 veces por día.

Niños de 6 a 12 años: 7,5 a 15 ml 3 a 4 veces por día.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a alguno de los principios activos.

Advertencias:

Contiene 4% P/V de alcohol etílico o etanol.

Precauciones:

Generales: Puede producirse la acumulación de secreciones acompañado de un mayor riesgo de ocasionar broncoespasmo e infecciones de las vías respiratorias. Se recomienda su uso con precaución en pacientes asmáticos, ya que puede producirse broncoespasmo acompañado de disnea aguda. En caso de manifestarse dicho efecto adverso, se indica interrumpir inmediatamente el tratamiento. Los mucolíticos pueden debilitar la barrera mucosa protectora gástrica por lo cual deben utilizarse con cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera péptica. La disfunción hepática o renal severas pueden disminuir el clearance de bromhexina y sus metabolitos. En caso de sospechar patología respiratoria grave, deberá tenerse en cuenta la administración de un tratamiento más adecuado. No es efectivo en fibrosis quísticas.

Pediatría: Dada la falta de datos sobre seguridad y eficacia en menores de 2 años, no se recomienda su uso en tal población.

Se desconoce la seguridad de PECTORAL HEBERT durante la lactancia.

El uso de clofediano puede disminuir los reflejos por lo tanto se recomienda evitar el uso de maquinaria que requiera permanente atención y uso de reflejos. Tener precaución al tomar supresores del apetito y de ingerir bebidas que contengan xantinas durante el tratamiento. Basado en la presencia de alcohol etílico/etanol, como excipiente se deberá tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños. No administrar en pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

Interacciones farmacológicas:

Los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central pueden potenciarse con el clofediano por lo que se desaconseja su uso concomitante. No debe administrarse concomitantemente bromhexina con agentes atropínicos. La bromhexina puede aumentar la penetración del antibiótico en las secreciones bronquiales pero faltan estudios para demostrar que esto se traduzca en un beneficio clínico en la curación de la infección.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante dicho período.

Reacciones adversas:

Urticaria, sequedad de boca, vértigo, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, mareos, pesadillas y alucinaciones. Excitación, irritabilidad, reacciones alérgicas, rash, edema facial y de mucosas, hipotermia, taquipsigmia, aumento de la sudoración, disnea.

Sobredosificación:

Puede observarse excitación psicomotriz o somnolencia profunda. Las medidas terapéuticas estarán dirigidas a mantener adecuadamente las funciones vitales.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutierrez
Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital Dr. Alejandro Posadas
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Presentaciones:

Frasco por 100 ml.

Conservar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. E.M.A.M.A. Certificado N° 42.840
Director Técnico: Carlos Fiorito - Farmacéutico.
Elaborado en Coronel Méndez 438/440 B1875DQJ - Wilde - Prov. de Buenos Aires.
Fecha de última revisión: 10/05

Laboratorios Fecofar

Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Prov. de Buenos Aires.

