

Supositorios de Glicerina Fecofar

Infantes

VENTA LIBRE
Industria Argentina

FECOFAR

Fórmula:

Cada supositorio contiene:

Glicerina 1,64 g

Estearato de sodio c.s.p 1,82 g

Acción terapéutica:

Laxante osmótico.

Indicaciones:

Está indicado exclusivamente cuando no pueda utilizarse la vía oral. Para la evacuación del colon antes de estudios radiológicos.

Acción farmacológica:

Estimulante del peristaltismo (movimiento) intestinal, obteniéndose como consecuencia el aumento de la frecuencia de las deposiciones.

Farmacocinética:

La glicerina es un agente osmótico que no se absorbe desde el intestino y es resistente a la digestión.

Posología y forma de administración:

Introducir un supositorio en la ampolla rectal y esperar de 15 a 30 minutos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la glicerina.

Advertencias y precauciones:

El abuso en el uso de laxantes puede llevar a dolores abdominales, debilidad, sed, vómitos. Se puede producir una gastroenteropatía perdedora de proteínas y un desbalance hidroelectrolítico. Se desconoce la seguridad de uso de los supositorios de glicerina durante el embarazo y la lactancia. Dado que la constipación puede ser síntoma de afecciones severas se recomienda la consulta médica antes de iniciar un tratamiento con supositorios de glicerina. No utilizar este medicamento por más de 3 días ininterrumpidos. Si el síntoma persiste o empeora consultar con un médico. Solo para uso por vía rectal. Ante todo cuadro de constipación reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre o distensión abdominal, consultar con un médico antes de utilizar este medicamento. No utilizar en presencia de hemorroides, fisura anal o sangrado anal.

Reacciones adversas:

Ocasionalmente irritación (ardor) perianal.

Sobredosificación:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentaciones:

Envases conteniendo 10 supositorios

Conservar en lugar fresco y seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 32.364

Director Técnico: Carlos Fiorito, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 11/01

Laboratorios Fecofar

Av. Pte. J. D. Perón 2742

(B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.