

Ibuprofeno

COMPRIMIDOS

Venta bajo receta • Industria Argentina

Fórmula:

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno CD 90	666 mg
(corresponde a Ibuprofeno 600 mg, Almidón de maíz 33,33mg, Estearato de magnesio 33,33mg)	
Celulosa microcristalina pH101	55,78 mg
Almidón Glicolato de Sodio	23,52 mg
Aerosil	5,7 mg
Estearato de Magnesio	5,0 mg

Acción terapéutica

Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.

Indicaciones

Tratamiento del dolor medio a moderado. Procesos inflamatorios. Cefaleas. Lumbociática u otros síntomas radiculares. Dolores traumáticos y reumáticos. Neuralgias incluída neuralgia herpética. Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Odontalgias. Dismenorrea. Mastitis. Dolor post-parto. Dolor post-operatorio, dolor post-episiotomía. Cuadros febriles. Dolor secundario a enfermedad neoplásica. Dolor por neuropatía. Dolores músculo-esqueléticos crónicos. Peiartritis escapulothumeral. Espondilitis anquilosante. Discopatías. Artritis reumatoidea, artrosis (osteoartritis) y otras enfermedades del tejido conectivo. Enfermedad de Paget.

Propiedades farmacológicas

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Controla el dolor y la inflamación asociándose con menores efectos gastrointestinales. Esta droga ha demostrado clínicamente tener también propiedades analgésicas y antifébriles.

Farmacocinética:

Los niveles séricos de ibuprofeno se alcanzan 1 a 2 horas luego de la administración oral. Estas no cambian con el ayuno. Las comidas pueden disminuir levemente la biodisponibilidad de la droga cuando ésta no se administra inmediatamente después de las comidas. Los antiácidos no alteran la absorción de ibuprofeno. La vida media media del ibuprofeno es de 1,8 a 2,0 horas. Se metaboliza rápidamente y se elimina por orina, 1% libre y 14 % conjugado. La dosis completa se elimina a las 24 horas de la ingesta.

Posología y forma de administración:

Dolor moderado a medio: 1 comprimido (600 mg) cada 6 u 8 horas.
Dosis de mantenimiento: 1 comprimido (600 mg) cada 12 horas. No exceder los 3200 mg diarios.
Dismenorrea: Comenzando desde el inicio del dolor, 1 comprimido (600 mg) cada 6 horas
Liberación de síntomas de osteoartritis y patologías reumáticas: 1200 a 3200 mg diarios.

Contraindicaciones

Alergia al ibuprofeno, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios. Últimos 3 meses de embarazo, salvo que sea indicado por el médico, dado que puede causar problemas en el feto o complicaciones durante el parto.

Precauciones

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que el ácido acetilsalicílico y el paracetamol no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Se aconseja no administrar a pacientes con úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Advertencias:

Se aconseja no administrar este medicamento a pacientes con antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva. Administrar sólo si es necesario a pacientes con deterioro de la función renal, extremando los cuidados. Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia y reacciones de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria).

Interacciones medicamentosas:

Pueden producirse interacciones medicamentosas con:
Anticoagulantes orales y heparina aumentando el riesgo de hemorragia.
Litio, aumentando el nivel sérico de este elemento así como una disminución de su depuración renal.
Diuréticos, reduciendo el efecto natriurético de la furosemida y de las tiazidas.
Otros AINEs, potenciando los efectos adversos propios de este tipo de medicamentos.
Metotrexato, disminuyendo la eliminación renal de esta droga y aumentando el nivel plasmático y consecuentemente el riesgo de toxicidad.

Efectos colaterales:

El efecto adverso más frecuente son los trastornos gastrointestinales. Por sobredosis puede producir: desórdenes gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor epigástrico, dolor abdominal, calambres abdominales, trastornos de la sangre (anemia, trombocitopenia), reacciones dermatológicas de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria), dolores de cabeza, mareos, retención de líquidos, edema, sequedad de boca y ojos, úlcera gingival, rinitis.

Sobredosis:

En caso de la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación:

Envases con 10, 20 y 100 comprimidos.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco y seco, a temperaturas menores de 25°C.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 40.855
Director Técnico: Carlos Fiorito, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 03/07

Laboratorios Fecofar

Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV)
San Justo, Pcia. de Buenos Aires.